

مراقبت های لازم بعد از آمنیوسنتز و کوردوسنتز

بیمار عزیز لطفا به توصیه های زیر توجه فرمائید:

- بعد از انجام آمنیوسنتز استراحت کنید(تا پایان آن روز)
- از فعالیت شدید و یا ورزش پرهیز کنید.
- سعی کنید مایعات بیشتر مصرف کنید.
- به مدت دوروز از نزدیکی جنسی خودداری کنید.
- در صورت بروز درد خفیف در ناحیه ورود سوزن یا کرامپ مختصر میتوان از یک یا دو قرص استامینوفن استفاده کرد.
- در صورت بروز خونریزی واژینال - خروج مایع آمنیوتیک - کرامپهای طولانی (بیش از ۴-۶ ساعت) و یا تب و لرز حتما مراجعه نمایید.
- روز بعد از آمنیوسنتز می توانید فعالیت های معمول خود را شروع کنید.

لطفا پس از دریافت جواب آزمایش جهت تکمیل پرونده، مجدداً به پزشک معالج خود مراجعه فرمائید.

تلفن مرکز آموزشی و درمانی طالقانی: ۰۴۱-۳۴۴۲۴۴۲۰-۵

سایت بیمارستان: taleganihosp.tbzmed.ac.ir

مرکز آموزشی درمانی
آیت الله طالقانی تبریز