

## آموزش های والدین نوزادان ختنه شده

والد عزیز لطفا به توصیه های زیر توجه فرمائید:

- تا ۴ ساعت شستشو داده نشود و تادوروز حمام نشود.

- قطره استامینوفن در روز اول و دوم طبق دستور داده شود و در روزهای بعد در صورت درد داده شود.

- شربت آنتی بیوتیک تا زمان افتادن حلقه داده شود.

- در صورت مشاهده خونریزی و یا ادرار نکردن تا ۴ ساعت حتما به پزشک کودکان مراجعه نمایید.

- از کهنه استفاده نشود و از پوشک بچه یکبار مصرف استفاده شود.

- با آب ولرم پس از هر بار ادرار یا مدفوع شسته شود، سپس خشک شود و تا افتادن حلقه روزانه ۲ تا ۳ بار بتادین ریخته شود.

- پس از شیردهی حتما نوزاد بغل شود تا آروغ بزند.

- پماد تتراسایکلین طبق دستور از موقع ختنه به مدت ۳ روز استفاده شود، سپس بتادین زده شود.

تلفن مرکز آموزشی و درمانی طالقانی: ۰۴۱-۳۴۴۲۴۴۲۰-۵

سایت بیمارستان: [taleganihosp.tbzmed.ac.ir](http://taleganihosp.tbzmed.ac.ir)

مرکز آموزشی درمانی  
آیت الله طالقانی تبریز